

PROVEEDORES DE NALOXONA

Buscar centros de distribución en todo el Estado
www.nvopioidresponse.org

Agencias de reducción de daños

Change Point
445 Ralston Street, Reno, NV 89503
775-997-7519

Trac-B Exchange
6114 W Charleston Blvd., Las Vegas, NV 89146
702-840-6693

Proveedores de tratamiento
www.behavioralhealthnv.org

El precio promedio en efectivo
del aerosol nasal NARCAN en
Nevada es de \$75-\$145

El aerosol nasal NARCAN está
cubierto por NV Medicaid

Para obtener ayuda inmediata para servicios
de crisis de salud conductual, llame o
envíe un mensaje de texto al 988.

Seguridad de los opioides y cómo utilizar la naloxona



Este proyecto fue financiado en su totalidad o parcialmente por la Oficina de salud conductual, prevención y bienestar de la división de salud pública y conductual de Nevada a través de la financiación proporcionada por la Subvención de la administración de servicios de salud mental y abuso de sustancias para la respuesta del Estado de Nevada a los opioides.



NEVADA STATE
Opioid Response - An STR/ SDR Project



¿Qué es un opiode y cómo puede producirse una sobredosis?

Los opiodes incluyen drogas ilícitas como la heroína o medicamentos recetados para tratar el dolor como la oxicodona, la hidrocodona y el fentanilo. Una sobredosis de opiodes puede producirse cuando se toman demasiados opiodes a la vez o se mezclan con otras drogas y la respiración se ralentiza o se detiene.



Para evitar una sobredosis accidental de opiodes:

- Evite mezclar sus opiodes con alcohol, benzodiazepinas (Xanax, Ativan, Klonopin, Valium) o medicamentos que le produzcan sueño.
- Extreme las precauciones, si omite o cambia una dosis, si se encuentra mal o si empieza a tomar nuevos medicamentos.



Cómo identificar una sobredosis de opiodes:

Observe estos signos comunes:

- La persona no se despierta ni responde a la voz o al tacto.
- La respiración se ralentiza o incluso se detiene.
- Los labios y las uñas se vuelven azules o grises.



En caso de sobredosis:


1. Llame al 911 y administre naloxona.
2. Realice respiración artificial o compresiones torácicas
 - Compruebe que las vías respiratorias están despejadas.
 - Si están obstruidas, gírelas sobre un lado y haga un barrido con los dedos para despejarlas.
 - Gírelas hacia atrás, inclínela la cabeza hacia atrás y apriete la nariz.
 - Dele 2 respiraciones regulares.
 - Si sigue sin respirar por sí mismo, dele 1 respiración cada 5 segundos.
 - Continúe con la respiración artificial o las compresiones torácicas hasta que la persona se reanime o llegue la ayuda.
 - Cuando la persona empiece a respirar por sí misma, colóquela en posición de recuperación. Recuerde seguir dándole respiración hasta que la persona sea capaz de respirar por sí misma.
3. Colóquelo en posición de recuperación:
 - Coloque a la persona de lado, con el brazo por encima de la cabeza.
 - Coloque la rodilla y los brazos por encima del cuerpo de la persona para mantenerla de lado. Esto ayudará a evitar que se ahogue si vomita. Una vez administrada la naloxona, permanezca con la persona durante al menos 3 horas o hasta que llegue la ayuda.

Cómo administrar naloxona inyectable:

Paso 1: Retire el tapón del vial de naloxona y destape la aguja.

Paso 2: Gire el vial e inserte la aguja a través del tapón de goma. Hale del émbolo y extraiga 1 ml (1 cc) de líquido. Elimine el exceso de aire.

Paso 3: Inyecte en la parte superior del brazo, el músculo del muslo o las nalgas y vacíe la inyectadora.



Paso 4: Si no hay reacción o esta es mínima en 2 o 3 minutos, administre una segunda dosis.

La Ley del Buen Samaritano de Nevada ofrece protección contra la detención a las personas que buscan asistencia médica para una persona que experimenta una sobredosis de drogas o alcohol y el individuo que experimentó la sobredosis.

No se ofrece protección contra la detención por cargos relacionados con posesión con intención de vender/distribuir, negligencia/peligro de menores o para personas con órdenes de detención activas.

**Ahora que tienes naloxona...
Dígale a alguien dónde está y cómo usarla.**